




MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Sangue*

Via Giano della Bella, 27  
00162 Roma  
Tel: 06 4990 4953 / 4954  
Fax: 06 4990 4975  
E-mail: cns@iss.it



Ai Responsabili delle Strutture regionali  
di coordinamento per le attività trasfusionali  
delle Regioni e Province Autonome

Alle Direzione del Servizio Trasfusionale  
delle Forze Armate

Alle Associazioni e Federazioni Donatori Sangue:

AVIS  
CRI  
FIDAS  
FRATRES

E, p.c.:

Dott. Raniero Guerra  
Direttore Generale

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini  
Direttore Ufficio VIII - Sangue e Trapianti

Dott.ssa Maria Grazia Pompa  
Direttore Ufficio V

Direzione Generale della Prevenzione  
Ministero della Salute

Dott. Alessandro Nanni Costa  
Direttore Centro Nazionale Trapianti

Dott. Giulio Pisani  
Reparto Prodotti Biologici - CRIVIB  
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Caterina Rizzo  
Centro Nazionale Epidemiologia (CNESPS)  
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Nicoletta Sacchi  
Italian Bone Marrow Donor Registry (IBMDR)

**Oggetto: Aggiornamento della circolare Prot. n. 0563.CNS.2016 dell'08 marzo 2016 relativa alle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Zika virus mediante la trasfusione di emocomponenti labili.**

Facendo seguito alla circolare Prot. n. 0563.CNS.2016 emessa dallo scrivente Centro in data 8 marzo 2016, relativa alle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Zika virus mediante la trasfusione di emocomponenti labili, in considerazione degli aggiornamenti sulle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dello Zika virus forniti dall'*European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)* in data 09 marzo 2016 e alla luce di quanto emerso dal tavolo di discussione convocato dalla "*European Commission DG SANTE (Health and Food Safety), Unit B4-Medical Products: quality, safety, innovation*", si raccomanda di applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dopo l'ultimo rapporto sessuale per i donatori che riferiscano un rapporto sessuale con *partner* maschile con infezione documentata o sospetta (comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da Zika virus) oppure che abbia viaggiato o soggiornato in una zona con trasmissione attiva dello Zika virus **nei 6 mesi precedenti** (anziché "**nei 3 mesi precedenti**") il predetto rapporto.



Le restanti raccomandazioni restano invariate.

I Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento sono invitati a dare la massima diffusione all'aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da Zika virus contenute nella presente circolare, informando puntualmente anche le Banche del sangue di cordone ombelicale che operano sui territori di competenza.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

[http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika\\_virus\\_infection/zika-outbreak/Pages/risk-assessment.aspx](http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/risk-assessment.aspx)

Le raccomandazioni formulate nelle note dello scrivente Centro sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica.

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue


Dott. Giancarlo Maria Liunbruno

**Misure di sospensione temporanea per Zika Virus (ZIKAV):  
sospensione temporanea per 28 giorni per i donatori di sangue e di emocomponenti che abbiano soggiornato nelle  
aree dove si sono registrati i casi autoctoni di infezione.**



**Aggiornata in data 11 luglio 2016**

**AREE INTERESSATE**



➤ **CARAIBI**

- Martinica
- Saint Martin
- Haiti
- Barbados
- Guadalupa
- Porto Rico
- Repubblica Dominicana
- Isole Vergini Americane
- Curaçao
- Giamaica
- Aruba
- Bonaire
- Trinidad e Tobago
- Sint Maarten
- Saint Vincent e Grenadine
- Cuba
- Dominica
- Saint Lucia
- Saint-Barthélemy
- Grenada
- Anguilla
- Sint Eustatius

➤ **AMERICA LATINA**

- Brasile
- Colombia
- Suriname
- Paraguay
- Venezuela
- Guyana Francese
- Ecuador
- Guyana
- Bolivia
- Perù
- Argentina  
(Provincia di Tucuman)

➤ **ALTRE REGIONI**

- Capo Verde
- Thailandia
- Indonesia
- Maldive
- Filippine
- Vietnam
- Papua Nuova Guinea
- Guinea-Bissau (Isole Bijagos)
- Isole del Pacifico  
(costante presenza del virus)

➤ **AMERICA CENTRALE**

- Guatemala
- El Salvador
- Messico
- Panama
- Honduras
- Nicaragua
- Costa Rica
- Belize